



Wirus RSV to patogen powszechnie wywołujący infekcje układu oddechowego. Zakażenie RSV zazwyczaj ma łagodny przebieg. Wirus RS może jednak wywoływać także poważne – w tym groźne dla życia – zachorowania.

Wirus RSV co to jest?

Wirus RSV jest częstą przyczyną infekcji górnych dróg oddechowych i płuc. Atakuje zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Zakażenie RSV może mieć różny charakter. U dorosłych i starszych dzieci przebiega łagodnie, z objawami przypominającymi przeziębienie. W niektórych przypadkach patogen rozprzestrzenia się na dolne drogi oddechowe, powodując zapalenie oskrzelików lub zapalenie płuc.

U osób z grup ryzyka zakażenie może być ciężkie, a nawet zagrażać życiu.

W wyniku infekcji RSV niekiedy rozwija się też zapalenie ucha środkowego. Przypuszcza się również, że istnieje związek pomiędzy ciężkim zakażeniem RSV u dzieci, a ryzykiem rozwoju astmy w późniejszym życiu. Zakażenie RSV

Syncytialny wirus oddechowy wnika do organizmu przez oczy, nos lub usta. Patogen łatwo rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Wirus RSV można się zarazić, gdy znajdujemy się w pobliżu chorego, który kaszle lub kicha. Do zakażenia RSV dochodzi również poprzez bezpośredni kontakt,

np. uścisk dłoni. Ponadto źródłem zakażenia mogą być skażone przedmioty.

Chory jest najbardziej zakaźny w pierwszym tygodniu po kontakcie z wirusem. Jednak u niemowląt i osób z osłabioną odpornością patogen może rozprzestrzeniać się po organizmie do 4 tygodni. Ma to miejsce nawet po ustąpieniu objawów.

Infekcje RSV występują sezonowo. Często przybierają postać epidemii. W klimacie umiarkowanym najwięcej zakażeń notuje się od października do kwietnia.

Syncytialnym wirusem oddechowym można się zarazić wielokrotnie.

Objawy zakażenia wirusem RSV u dzieci i dorosłych

Objawy zakażenia wirusem RSV najczęściej pojawiają się 4-6 dni po kontakcie z patogenem. U osób spoza grupy ryzyka symptomy zwykle są łagodne i przypominają przeziębienie.

Objawy RSV:

- katar lub zatkany nos;
- kichanie;
- suchy kaszel;
- niska gorączka;
- ból gardła;
- ból głowy.

Objawy zapalenia płuc wywołanego wirusem RSV

Wirus RSV może również powodować zapalenie płuc lub zapalenie oskrzelików. W takim przypadku pojawiają się objawy, takie jak:

- gorączka;
- ciężki kaszel;
- świszczący oddech;
- trudności w oddychaniu;
- sinica.